GUÍA SANITARIA OFICIAL: PREVENCIÓN DE TRIQUINOSIS EN JABALÍ

Texto oficial consolidado de utilidad cinegética · Fuente: SENASA / Círculo de Caza Rosario

PROTOCOLO VETERINARIO OBLIGATORIO PARA PIEZAS DE CAZA

La **Triquinosis** es una zoonosis parasitaria causada por nematodos del género *Trichinella*, presente de forma endémica en poblaciones silvestres de jabalí europeo (*Sus scrofa*). No produce síntomas visibles en el animal vivo ni altera el aspecto exterior de la carne.

TOMA DE MUESTRA CORRECTA

1. **Tejido de Elección:** Extraer entre 100 y 150 gramos de los pilares del diafragma (la **entraña** del animal), que es el músculo con mayor densidad de larvas enquistadas.
2. **Conservación:** Colocar la muestra en una bolsa plástica limpia, refrigerada a entre 2°C y 8°C. **NUNCA CONGELAR** la muestra antes del análisis, ya que la cristalización destruye la estructura celular y dificulta la técnica diagnóstica.
3. **Remisión al Laboratorio:** Entregar en laboratorio bromatológico habilitado o veterinaria de confianza para la técnica oficial de **Digestión Artificial**.

MITOS PELIGROSOS A DESTERRAR

• **'El salame o la salazón matan el parásito': FALSO.** Las larvas sobreviven perfectamente al secado, ahumado, salazón y fermentación de chacinados.
• **'El freezer común mata la triquina': FALSO.** Las cepas silvestres autóctonas tienen resistencia comprobada a la congelación doméstica.
• **'A simple vista se ve si la carne está sana': FALSO.** Los quistes son microscópicos; solo la digestión enzimática en laboratorio garantiza inocuidad.

ADVERTENCIA DEL CÍRCULO:
NUNCA elabore chacinados ni comparta carne de jabalí con su familia o amigos sin el certificado de DIGESTIÓN ARTIFICIAL NEGATIVO. Cuidar la salud de los nuestros es la primera muestra de ética de un verdadero cazador deportivo.